

放 SRS - A, 抑制皮肤迟发型超敏反应。^[4]

3 小结

银屑病虽然表现在皮肤上, 但本因在于肾, 在于机体内的元气。治疗银屑病必须以肾治, 以提高机体内元气着手。银屑病的病理实质是由于机体免疫功能紊乱, 微循环障碍, 毛细血管瘀塞不通, 而造成体内代谢失常, 有效血液循环量下降, 细胞生长周期缩短而产生脱屑现象, 故荆夏敏提出“血热是假象, 血瘀是本质”^[5]。银屑病以本虚标实为主, 在临证中只要符合此病机, 就可以用温阳活血为基本法则, 运用温阳强肾、活血化瘀、解表消斑的治法。肾脏的元气充沛, 精血畅通, 气血得以温煦五脏、濡养四肢百骸则疾病自愈。但是, 临证中患者病情及个体差异性很大, 表现千差万别, 故在具体运用时应结合个体情况辨证施治, 在温阳活血的基础上酌用益气、理气、解表、消斑等法。

我们探讨的方法虽有驳于现行的主流治法, 但没

有违背中医学的理论实质。相反通过这种逆向思维对银屑病的病因病理和治疗用药进行了的反思, 其临证的有效性也揭示了这一方法的可行性和正确性。发挥中医药潜势, 在辨证的基础上反思银屑病, 运用温阳强肾、活血化瘀、解表消斑的方法治疗银屑病, 充分体现了中医学整体观的优势。随着中医药研究的逐步深入, 我们有信心认为中医药内治方法在银屑病研究领域中的独特优势将得到人们的关注。

参考文献

- [1] 丁华, 杨文凯, 张世玲, 等. 健脑补肾丸补肾作用初探. 中草药, 1990, 21(6): 22-25.
- [2] 张红梅. 人参与鹿茸配伍的作用机理研究. 中医药学刊, 2001; 19.
- [3] 叶加, 蒋益民, 钱伯文, 等. 理气药对荷瘤小鼠免疫功能的影响. 中草药, 1996, 27(2).
- [4] 卞如谦. 荆芥油药理研究. 浙江医科大学学报, 1981, (5): 219.
- [5] 荆夏敏. 银屑病理论与实践[M]. 山西科学技术出版社, 2001: 11.

(2009-10-26 收稿) ⊙

伟达慈丹胶囊联合介入疗法治疗原发性肝癌 300 例

郑东海¹ 董文杰² 郑东梁²

(1 福州伟达中医肿瘤医院, 35000; 2 北京伟达中医肿瘤医院)

关键词 原发性肝癌/中医药疗法; 慈丹胶囊

多来我们采用慈丹胶囊联合介入疗法治疗晚期原发性肝癌取得了一定疗效, 现总结报道如下。

1 临床资料

共收住院患者 500 例, 均经 B 超、CT、肝动脉造影、AF, 检验确诊为原发性肝癌, 符合《中国常见恶性肿瘤病诊治规范》中原发性肝癌病的诊断标准。随机分为 2 组, 治疗组 300 例, 男 200 例, 女 100 例, 中位年龄 56 岁。临床分期Ⅱ期 190 例, Ⅲ期 110 例。对照组 200 例, 男 100 例, 女 100 例, 中位年龄 54 岁。临床分期Ⅱ期 120 例, Ⅲ期 80 例。

2 方法

2 组患者均采用 Seldinger 插管行肝动脉介入化疗栓塞, 在明确肝肿瘤部位和范围后, 经导管注入化疗药物, 先将 5-Fu 注射液 0.75 ~ 1.0g、HeTP 注射液 10 ~ 15mg、DDP 注射液 30 ~ 40mg 注入肝动脉, 再用 40% 的碘 10 ~ 15mL 与 MMC 注射液 10 ~ 15mg 混合注入肝动脉栓塞。间隔 1 ~ 3 个月进行复查并重复上述化疗栓塞。2 组患者均进行上述 2 次治疗。治疗组在行上述治疗后再加用慈丹胶囊, 口服, 每次 5 粒, 1 日 3 次, 连用 60 天。

3 观察指标

近期疗效按照 RECIST 疗效标准行评定疗效: CR(完全缓解), PR(部分缓解), SD(稳定), PD(进展), 以 CR + PR 计算有效率。

4 结果

4.1 近期疗效 治疗组 PR210 例, SD7 例, PD2 例; 对照组 PR70 例, SD9 例, PD4 例。2 组均无 CR, 2 组(CR + PR)有效率分别为 70% 和 35%, 经统计学处理($P < 0.05$), 有显著性差异。

4.2 生存率 2 组患者随访 1 年, 治疗组存活率为 90%; 对照组存活率为 55%, 2 组间有显著性差异($P < 0.05$)。

4.3 症状疗效 2 组患者治疗前均有不同程度的肝区疼痛、黄疸、腹胀、食欲不振, 治疗后患者自觉症状均有不同程度改善。其中治疗组肝区疼痛减轻者达 92%; 腹胀减轻者占 88.9%; 乏力减轻者占 55.5%; 食欲改善者占 50%; 黄疸减轻者占 50%, 上述结果表明, 治疗组疗效明显优于对照组。

4.4 毒副作用 2 组患者治疗后仅有部分患者出现恶心、低热或右上腹胀以及肝功能的改变, 经过 1 周治疗后, 上述症状逐渐消失, 2 组比较治疗组反应较轻, 但 2 组无明显差异。

5 讨论

原发性肝癌早期难以发现, 一旦发现多为中、晚期。目前行之有效的治疗方法是介入化疗栓塞, 临床实践表明, 如果再加上中药治疗, 疗效较为显著。我们采用慈丹胶囊配合化疗栓塞。慈丹胶囊是中药复方胶囊, 由黄芪、莪术、蜂房、马钱子、冰片等药物组成。方中黄芪具有补气扶正作用, 莪术、冰片、蜂房具有活血化瘀、软坚作用。肝癌介入后正气受到损伤, 中药具有药力和缓而疗效持久的作用, 使肝肿瘤介入后既能恢复正气又具有协同作用, 疗效显著。

(2010-10-21 收稿) ⊙