HPLC - ELSD 测定黄芪生络复康丸中黄芪甲苷的含量

武爱玲¹ 赵新杰²

(1 河南省洛阳正骨医院, 洛阳, 471002; 2 河南省洛正制药厂, 洛阳, 471013)

摘要 目的: 采用 HPLC - ELSD 法建立黄芪生络复康丸中黄芪甲苷的含量测定方法。方法: 色谱柱为 Diamonsic C₁₈ (4.6 mm × 250 mm, 5 μm), 流动相为乙腈 - 水 (35:65) 为流动相, 流速为 1.0 mL · min⁻¹, 柱温为 40 °C。ELSD 检测器, 雾化器温度 80 °C, 蒸发器温度 100 °C, 载气流速 1.5 mL · min⁻¹。结果: 黄芪甲苷进样量在 1.62 ~ 8.10 μg 时线性关系良好, r = 0.999 9, 平均加样回收率为 99.08% (RSD = 1.63%)。结论: 本方法简便、准确、专属性强, 可用于本品的质量控制。

关键词 HPLC - ELSD; 黄芪生络复康丸; 黄芪甲苷; 含量测定

HPLC-ELSD Determination of Astragaloside in Huangqi Shengluo Fukang Pill

Wu Ailing¹, Zhao Xinjie²

(1 Henan Luoyang Orthopedic-Traumatological Hospital, Luoyang 471002, China;

2 Henan Luozheng Pharmaceutical Factory, Luoyang 471013, China)

Abstract Objective: To establish a content determination method of Astragaloside in Huangqi Shengluo Fukang Pill by HPLC-ELSD. **Methods:** The chromatographic Column Diamonsic C₁₈ (4.6mm × 250mm, 5μm) was set. The mobile phase consisted of acetonitrile and water (35:65), and the flow rate was 1.0mL · min⁻¹. The column temperature was 40°C, and the content was determined with evaporate light scattering detector (ELSD). The temperature of spray chamber was 80°C and the temperature of evaporator was 100°C. The gas flow rate of parameter of ELSD was 1.5mL · min⁻¹. **Results:** The linear range of Astragaloside was within 1.62 to 8.10μg (r = 0.9999). The average recovery rate was 99.08% (RSD = 1.63%). **Conclusion:** The established method is convenient and accurate and highly specific, and it can be used for the quality control of Huangqi Shengluo Fukang Pill.

Key Words HPLC-ELSD; Huangqi Shengluo Fukang Pill; Astragaloside; Determination

中图分类号: R286.0 文献标识码: A doi: 10.3969/j.issn.1673-7202.2014.05.031

黄芪生络复康丸是本院的内部制剂, 由黄芪、淫羊藿、丹参、赤芍、川芎、桃仁等药组成, 具有补气益肾生髓, 活血化瘀生络的作用, 用于不完全性周围神经损伤及周围神经变性。原标准中采用薄层扫描法对黄芪甲苷进行含量测定^[1], 因薄层扫描法含量测定重现性较低, 操作繁琐, 测定周期长。为了更有效地控制其产品质量, 本文应用高效液相色谱法测定黄芪生络复康丸中黄芪甲苷的含量, 并对其进行方法学考察。结果表明, 该法简便快速, 结果准确。

1 仪器与试剂

shimadzu LC - 20A 高效液相色谱仪 (日本岛津公司), LC Workstation, 配有四元梯度泵、在线脱气机、柱温箱、自动进样器; ELSD - 2000ES 型蒸发光散射检测器 (美国 Alltech 公司)。AB135 - S 型梅特勒拖利多电子天平, METTLER AE200 电子分析天平。黄芪甲苷对

照品 (批号: 110781 - 200613) 购自中国药品生物制品检定所。试剂均为分析纯。六批样品均由河南省洛阳正骨医院制剂科生产并提供。

2 方法与结果^[2-13]

2.1 色谱条件 Diamonsic C₁₈ 柱 (4.6 mm × 250 mm, 5 μm); 以乙腈 - 水 (35:65) 为流动相进行洗脱, 流速: 1.0 mL · min⁻¹; 柱温: 40 °C; ELSD 检测器, 雾化器温度 80 °C, 蒸发器温度 100 °C, 载气流速 1.5 mL · min⁻¹。色谱柱的理论塔板数以黄芪甲苷峰计不低于 3 000。进样量: 10 μL。

2.2 系统适用性试验 在选定条件下, 供试品色谱中, 在与对照品色谱相应的位置上, 有相同保留时间的色谱峰, 且与其他相邻色谱峰分离度大于 1.5。理论塔板数以黄芪甲苷峰计在 3 000 以上, 而阴性对照在此保留时间无干扰 (见图 1)。

作者简介: 武爱玲 (1978—), 女, 河南省洛阳正骨医院, 主管药师, 硕士, 主要从事医院制剂开发与研究工作

通信作者: 赵新杰 (1972—), 男, 河南省洛正制药厂, 副研究员, 地址: 河南省洛阳市白马寺车站路北 1 号河南省洛正制药厂, E-mail: wal2317@163.com

2.3 对照品溶液的制备 精密称取在 60 ℃ 真空干燥 4 h 的黄芪甲苷对照品适量,用甲醇溶解,制成每 1 mL 含黄芪甲苷 700 μg 的溶液作为对照品 1,吸取对照品 1 溶液适量,甲醇稀释制成每 1 mL 含黄芪甲苷 260 μg 的溶液作为对照品 2,即得。

图 1 黄芪生络复康丸 HPLC 图谱

注:A. 对照品;B. 供试品;C. 阴性对照;1. 黄芪甲苷

2.4 阴性对照液的制备 取缺黄芪的阴性样品,按供试品溶液的制备方法进行处理,制得阴性对照液。

2.5 供试品溶液的制备 取本品研细,取约 5 g,精密称定,加水 10 mL,微热溶解,转移至分液漏斗中,水饱和正丁醇 40 mL,萃取 4 次,合并正丁醇层,再取氨试液 40 mL,萃取 2 次,弃去氨水层。减压浓缩回收正丁醇至干,残渣用甲醇溶解定容于 10 mL,摇匀,即得。

2.6 线性关系考察 精密称取黄芪甲苷对照品 1 620 mg,置 10 mL 的棕色量瓶中,加甲醇溶解,稀释至刻度,摇匀。精密吸取 2.5,2.0,1.5,1.0,0.5 mL 置 5 mL 的

量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀。分别精密吸取 10 μL 进样,测定其峰面积,以黄芪甲苷进样量的对数为横坐标,以峰面积的对数为纵坐标,绘制标准曲线,进行回归分析,得黄芪甲苷的回归方程 $Y = 0.9987X + 6.6407$, $r = 0.9999$,线性范围为 1.62 ~ 8.10 μg。

2.7 精密度试验 精密吸取“2.3”项下对照品 2 溶液 10 μL,重复进行 5 次,测定黄芪甲苷峰面积积分值。结果其相对标准差 RSD 为 1.56%。

2.8 重现性试验 取同一批号供试品,按“2.5”项下方法制成供试品溶液 5 份,分别进样 10 μL,测定黄芪甲苷峰面积积分值。结果 RSD 为 1.38%。

2.9 稳定性试验 精密吸取同一份供试品溶液 10 μL,分别于 0、2、4、6、8、10、12 h 时进样,测定黄芪甲苷峰面积积分值。结果 RSD 为 1.67%,表明供试品溶液在 12 h 内基本稳定。

2.10 加样回收率试验 精密称取已测定含量的黄芪生络复康丸细粉(批号:120601)2.5 g,共 6 份,各加入黄芪甲苷浓度为 1.402 mg/mL 的混合对照液 2 mL,分别用与“2.5”项下方法制得供试品溶液,各进样 10 μL,进行测定,计算回收率,结果见表 1。

表 1 加样回收率测定结果(n=6)

取样量 /g	样品含量 /mg	加入量 /mg	测得量 /mg	回收率 /%	平均回收率/%	RSD /%
2.5103	2.8617	2.8040	5.6057	97.86	99.08	1.63
2.5010	2.8511		5.6444	99.62		
2.4576	2.8017		5.6155	100.35		
2.4897	2.8383		5.5590	97.03		
2.5020	2.8523		5.6930	101.31		
2.4967	2.8462		5.6037	98.34		

2.11 样品测定 取 6 个批号的样品,按“2.5”项下方法制成供试品溶液,分别精密吸取两个浓度的对照品溶液与供试品溶液各 10 μL,注入液相色谱仪,测定,外标两点法计算,即得。结果见表 2。

表 2 样品含量测定结果(n=2)

批号	黄芪甲苷含量/mg · g ⁻¹	批号	黄芪甲苷含量/mg · g ⁻¹
120601	1.14	120604	1.19
120602	1.04	120605	1.08
120603	1.15	120606	1.45

3 讨论

黄芪甲苷含量测定方法较多,主要有高效液相色谱法、薄层扫描法、比色法、荧光法等几大类方法^[14]。但大多数制剂由于成分复杂,干扰严重;近年来,随着新型检测器 ELSD 的出现,使原本无紫外吸收的黄芪甲苷也得以很好的分离,HPLC 法因操作简单、快速、灵

敏度高、重现性好而优于其他方法。

黄芪生络复康丸是本院的内部制剂,原标准中采用薄层扫描法对黄芪甲苷进行含量测定,工作中经常出现展开系统不稳定,分离效果欠佳的情况,另因薄层扫描法含量测定重现性较低,操作繁琐,测定周期长。故本方法采用了 ELSD-HPLC 法。

样品处理方法文献上有索氏提取脱酯后萃取法、超声提取后萃取法、大孔树脂提取法、KOH 回流提取法、中性氧化铝柱法^[15-16]。本研究分别比较了溶剂两相萃取、大孔吸附树脂和中性氧化铝柱 3 种方法。结果表明,大孔吸附树脂法在洗脱过程中易产生气泡,且保留率较低。中性氧化铝柱可吸附大部分水溶性及脂溶性杂质,能有效除去样品溶液中较多杂质,但操作繁琐。而溶剂萃取法操作简便,且能除去大部分杂质,使样品溶液得到较好的精制效果。故选用溶剂萃取法。

流动相的选择,考察了 5 种展开系统对黄芪生络复康丸中黄芪甲苷的分离及含量测定的影响。曾采用甲醇-水(80:20)、甲醇-水(75:25)、乙腈-水(30:70)、乙腈-水(32:68)、乙腈-水(35:65)等不同流动相,结果测定流动相为乙腈-水(35:65)时黄芪甲苷峰形良好,可达到基线分离,与相邻峰分离度较好。本试验也对柱温条件进行了考察,结果表明柱温在 40℃ 时峰形较好。

ELSD 检测器参数的确定:经多次试验,并按 ELSD 检测器设置要求,确定了雾化器温度 80℃,蒸发器温度 100℃,载气流速 1.5 mL·min⁻¹。因为温度过高或过低直接影响溶剂的挥发程度,进而影响基线的稳定性。

综上所述,本方法操作简便、结果准确,重复性好,加样回收率高,可用于黄芪生络复康丸的含量测定。

参考文献

[1] 刘晓红,谢艳,王志国. 黄芪生络复康丸的质量标准研究[J]. 中医药

信息,2005,22(4):81-82.

- [2] 施佳平. 高效液相色谱-蒸发光散射检测法测定芪黄胶囊中黄芪甲苷的含量[J]. 中国药学,2006,17(13):1013-1014.
- [3] 李飞,周洪雷,杜昊忱,等. 高效液相色谱-蒸发光散射检测法测定心脑血管口服液中黄芪甲苷含量[J]. 中国药业,2011,20(5):16-17.
- [4] 张伟,马久太,王晓梅. HPLC-ELSD 法测定宫瘀净胶囊中黄芪甲苷的含量[J]. 世界中医药,2011,6(4):349-350.
- [5] 何江敏,丁洁,叶虹. 高效液相色谱-蒸发光散射法测定养胃颗粒中黄芪甲苷含量[J]. 中国药业,2010,19(22):43-44.
- [6] 朱克旭,李永宏,刘冰冰. HPLC-ELSD 法测定芪心合剂中黄芪甲苷的含量[J]. 安徽医药,2011,15(1):1364-1365.
- [7] 雷健,胡雪莲,金一南,等. 高效液相色谱-蒸发光散射法测定益生胶囊中黄芪甲苷含量[J]. 中国药业,2012,21(16):47-48.
- [8] 张风瑞,周贤,刘炎. 当归补血汤中黄芪的鉴别及黄芪甲苷的含量测定[J]. 吉林中医药,2013,33(3):289-291.
- [9] 潘宏林,张坦,赵元元. 不同提取方法对黄芪药材中黄芪甲苷含量测定的影响[J]. 中药材,2004,27(10):774-775.
- [10] 张蕾,高文远,满淑丽. 黄芪中有效成分药理活性的研究进展[J]. 2013,37(21):3203.
- [11] 王迅,李辉,陈方超. 健肾片 II 号中黄芪甲苷含量测定的影响因素[J]. 中国药师,2009,12(8):1155-1157.
- [12] 代丽萍,石任兵,梁吉春. 芪芍方有效部位中黄芪甲苷和黄芪总皂苷质量控制方法的建立[J]. 北京中医药大学学报,2010,33(4):270-273.
- [13] 张杰,张凌艳,李贺一. 生血康口服液黄芪甲苷含量测定方法学研究[J]. 黑龙江医药,2011,24(1):23-24.
- [14] 欧阳春华. 黄芪甲苷含量测定几种常用方法的比较[J]. 中国现代药物应用,2009,3(15):139-141.
- [15] 于慧斌,张晓燕,雷龙,等. “前愈”浓缩丸中黄芪甲苷含量测定的预处理方法[J]. 中国药业,2007,10(9):935.
- [16] 刘浩文,刘嘉仪,杨妙荣,等. 黄芪药材中黄芪甲苷含量测定的两种方法的比较研究[J]. 中药新药与临床药理,2011,22(6):659-662.

(2013-05-29 收稿 责任编辑:徐颖)

(上接第 570 页)

- [14] 马素娜,谢世平,郭会军,等. 艾滋病及病毒携带者 282 例咳嗽病例回顾性分析[J]. 中医学报,2011,26(5):513-516.
- [15] 桑海艳,谢世平,武兴伟. 艾滋病腹泻病例回顾的因子分析[J]. 光明中医,2011,26(3):457-459.
- [16] 王艳春,彭勃,李雁,等. 艾滋病与非艾滋病发热的流行病学对照调查研究[J]. 中华中医药杂志,2012,27(4):1201-1205.
- [17] 姜枫,符林春,马建萍,等. 艾滋病中医病因病机中的地域因素[J]. 中国中西医结合杂志,2012,32(6):748-750.
- [18] 姜枫,彭勃,谢世平,等. 基于“艾毒伤元”假说的艾滋病中医病因病机临床调查表的制定[J]. 时珍国医国药,2011,22(11):2777-2778.

- [19] 彭勃,王丹妮. 对艾滋病无症状 HIV 感染期的认识[J]. 中华中医药杂志,2006,21(11):663-665.
- [20] 何慧婧,徐鹏,辛倩倩,等. 艾滋病单阳家庭安全套使用情况及影响因素[J]. 中华疾病控制杂志,2013,17(5):392-395.
- [21] 崔兆麟. 河南省 3 个艾滋病疫情高发村 HIV 家庭内传播规律队列研究[D]. 北京:中国疾病预防控制中心,2009.
- [22] 陈晓楠. “同气相求”理论内涵及其对中医基本理论的影响[J]. 中医学报,2011,26(12):1454-1455.
- [23] 朱文锋. 证素辨证学[M]. 2 版. 北京:人民卫生出版社,2008:88.
- [24] 姜枫,符林春,马建萍,等. HIV 感染者和艾滋病患者的中医证素分布特点[J]. 中西医结合学报,2011,9(9):955-964.

(2014-03-17 收稿 责任编辑:洪志强)