

组成,主药丹参、三七、山楂,主要用以防治舌下络脉一级瘀滞的心脑血管疾病。每次5~10g,日3次。可连服半年至2年。一般服药3天即可起效,自觉症状减缓,身体轻松,而舌下络脉一级瘀滞可获迅速逆转。

3.2 血管舒Ⅱ号 血管舒Ⅱ号为水丸剂,由10味中药组成,主药水蛭、藏红花、西洋参,主要用以治疗舌下络脉二级瘀滞的心脑血管疾病。每次5~10g,日3次。可连服半年至2、3年。兹举黄老所治病案1例:患者某,男,83岁,书法家。出现症状:头晕、心慌、手抖、眠差、口唇发紫、行动困难。20年前经重庆医科大学附一院诊断为冠心病、脑血管硬化、大脑供血不足,长期服成药地奥心血康、丹参片与速效救心丸等,病情一直无明显好转。继后求治,诊舌下络脉二级瘀滞,予血管舒Ⅱ号,服用8个月,舌下络脉退回到一级瘀滞,各种症状明显好转。

3.3 血管舒Ⅲ号 血管舒Ⅲ号为胶囊剂,由8味中药组成,主药藏红花、冬虫夏草、地龙、西洋参,主要针对舌下络脉三级瘀滞的严重心脑血管疾病。每次1~3粒,日3次,葡萄糖水或蜂蜜水送服,一般5~20min即可消除严重心慌、头晕等危象。兹再举黄老所治病案

1例:患者某,女,62岁,医生。高血压20余年,近年因冒寒咳嗽,曾连续静滴双黄连注射液2天,导致病情危重,经西南医院诊断,结论为:心、肺积水,水肿,心衰,心梗。继则出现冠脉梗阻,安上支架,住院7次,花费20余万元。后服进口抗凝药“波立维”,出现严重恶心、呕吐、厌食而求治。诊舌下络脉三级瘀滞,立予血管舒Ⅲ号吞服,30min后即得减缓。服血管舒Ⅲ号半年,舌下络脉瘀滞已接近一级,现饮食、睡眠可,一切接近正常。

黄老强调,血管舒Ⅲ号不仅能在半年至1年时间消除动脉粥样硬化、静脉血管栓塞、血管内瘀斑和舌下瘀斑,而且连一部分老年斑也能在1~2年间消除。这对于老年人的长寿健康无疑具有相当的意义。

事实证明,黄老依凭舌下络脉来判断心脑血管疾病严重程度,并据此作相应力度的补肾强心、益气活血、化瘀通络的治疗,并依凭舌下络脉予以判断,具有比其他依凭标准更加准确、简单、明了的特点。舌下络脉作为人体缩影全息单元舌的一个重要组成部分,是值得我们去进一步深入研究的。

(2008-02-13 收稿)

调经丸治疗闭经 108 例

梁为生 闫永梅

(山东省枣庄市台儿庄区中医院,277400)

关键词 闭经/中医药疗法; @ 调经丸

我们自2001年2月以来,采用自拟调经丸治疗闭经108例,取得了明显疗效,兹报道如下。

1 病例资料

病例来自我院妇科门诊患者。随机分为治疗组108例,其中未婚20例,已婚88例,年龄在16~43岁,病程6个月~12年,平均年龄31岁;对照组80例,其中未婚12例,已婚68例,年龄在16~45岁,病程5个月~11年,平均年龄32岁。2组病例在年龄、病程、症状、病情等方面比较,无显著性差异,具有可比性。

2 治疗方法

治疗组采用补肾益气,养血调经。方药组成:菟丝子586g,淫羊藿510g,牛膝390g,益母草520g,续断300g,黄芪560g,当归240g,黄精520g,制香附200g,炙甘草190g。将以上10味药混合,干燥,粉碎成细粉混合后,过7号筛,水泛为丸,每丸重1g,干燥贮存。用法:每日饭后约30min服用,1次6g(6丸),每日3次,1个月为1个疗程。对照组服用氯米芬,应来月经的第5

天至第10天口服,每日1次;补佳乐1mg,应来月经的第10天至26天口服,每日1次;黄体酮20mg,应来月经22天至26天肌肉注射,每日1次。

3 疗效标准

依据《中医病证疗效标准》,痊愈:临床症状、体征等完全消失;显效:临床症状、体征等明显好转;有效:临床症状、体征等有所好转;无效:临床症状、体征等与用药前没有变化。治疗结果:治疗组108例,痊愈62例,显效34例,有效7例,无效5例,总有效率95.3%。对照组80例中,痊愈39例,显效24例,有效8例,无效9例,总有效率88.7%。统计学处理, $P < 0.05$,有显著疗效。

4 讨论

根据闭经发病机理,组方以补肾益气、养血调经为主要原则。调经丸方中菟丝子、淫羊藿补阳益阴、补肾填精;黄精滋阴填髓、补脾益气;川续断、牛膝补肝肾,行血脉;香附疏肝理气;黄芪、当归、炙甘草益气补血;牛膝、益母草活血祛瘀。综观全方配伍严谨,标本同治,效专力宏。

(2008-09-11 收稿)