

天麻钩藤饮加减治疗重度妊娠高血压综合征 56 例

王随英¹ 潘亚敏²

(1 商丘市中医院,河南省商丘市团结东路 38 号,476000; 2 临颍县中医院)

关键词 重度妊娠高血压综合征/中医药疗法;天麻钩藤饮

妊娠高血压综合征(简称妊高征),是妊娠期妇女所特有而又常见的疾病,以高血压、水肿、蛋白尿、抽搐、昏迷、心肾功能衰竭,甚至发生母子死亡为临床特点。妊娠高血压综合征按严重程度分为轻度、中度和重度,重度妊娠高血压综合征又称先兆子痫和子痫。常用的抗癫痫药由于副作用大,服药期长,在服药期间很多患者难以坚持正常的学习和工作,因此,有必要寻找一种毒副作用低、确切有效、不影响患者正常生活的药物。我们应用天麻钩藤饮加减组方治疗重度妊娠高血压综合征 56 例,取得较为满意的疗效,现报道如下。

1 资料

1.1 病例选择 1)有诊断依据,即要有详细可靠的发作病史和脑电图的阳性发现,包括详细的体格检查、神经系统检查资料;2)符合妊娠高血压综合征的诊断标准;3)排除服用药物(如甘草和生胃酮、某些非固醇类抗风湿药、某些激素类避孕药等)致血压升高。

1.2 一般资料 选择重度妊娠高血压综合征 111 例,随机分为 2 组。天麻钩藤饮加减方治疗组 56 例,年龄平均(20.1±6.3)岁。病程 3 年以上者 12 例,2 年以上者 21 例,1 年以上者 12 例,1 年以内者 11 例。发作类型:部分性发作 23 例,全面性发作 33 例。辨证分型:肝风痰浊型 11 例,肝火痰热型 20 例,瘀血型 23 例,虚证型 2 例。西药对照组 55 例,年龄平均(22.3±7.2)岁。病程 3 年以上者 10 例,1 年以上者 16 例,1 年以内者 18 例。发作类型:部分性发作 17 例,全面性发作 38 例。辨证分型:肝风痰浊型 9 例,肝火痰热型 26 例,瘀血型 17 例,虚证型 3 例。

1.3 诊断标准 妊娠高血压综合征(简称妊高征)诊断标准,参照国家中医药管理局全脑病急症协作组病症诊断与疗效评定的试行标准^[1]制定。

2 方法

2.1 治疗方法 治疗组服用天麻钩藤饮加减方(天麻 20g,钩藤 20g,蜈蚣 5 条、僵蚕 20g,石决明 20g,黄芩 10g,栀子 15g,桑寄生 20g,杜仲 10g,益母草 20g,川牛膝 10g,夜交藤 20g,茯神 20g),每日 1 剂,水煎 2 次,取汁 200mL,早晚 2 次分服。3 个月复查脑电图评定疗

效。服本药的同时,停用其他药物。对照组全身性发作给予苯妥英钠,每次 0.1g,每天 3 次,部分性发作给予丙戊酸钠,每次 0.5g,每天 3 次,服药方法及检查方式同治疗组。

2.2 疗效标准 按国家中医药管理局脑病急症协作组制定的标准执行^[1],根据治疗前后癫痫计分指数的变化计算疗效百分数。基本控制:疗效百分数为 92~100%(含 92%),癫痫不再发作;显效:疗效百分数为 70~92%(含 70%)或发作频率减少 75%;有效:疗效百分数为 40~70%(含 40%)或发作频率减少 50%;效差:疗效百分数为 20~40%(含 20%)或发作频率减少在 25~50%;无效:疗效百分数为 20% 以下或发作频率减少小于 25%。

2.3 统计学方法 疗效比较采用 χ^2 检验。

3 结果

3.1 天麻钩藤饮加减方治疗重度癫痫发作总有效率 89.29%,治疗前后对比存在极显著性差异, $P < 0.01$,见表 1。

3.2 天麻钩藤饮加减方和苯妥英钠治疗癫痫发作,基本控制率、显效率、有效率对比均存在显著性差异, $P < 0.05$,见表 1。

表 1 治疗组和对照组治疗癫痫发作疗效比较例(%)

组别	例数	基本控制 例数(%)	显效例数 (%)	有效例数 (%)	效差例数 (%)	无效例数 (%)	总有效 数(%)
治疗组	56	12(10.81)	*17(15.32)	*14(12.61)	*7(6.31)	6(5.41)	50(45.05)
对照组	55	7(6.31)	11(9.91)	8(7.21)	19(8.11)	10(9.01)	45(40.54)

注:2 组比较,* $P < 0.05$ 。

4 讨论

重度妊娠高血压综合征^[2]是在遗传易感的基础上,因各种原因而导致的神经元异常放电,并引起暂时性中枢神经系统功能失常的慢性疾病。发作时因意识障碍可致各种外伤,长期发作还会引起智能低下甚至痴呆,呈持续状态时可因呼吸衰竭而死亡。本病是早产、宫内胎儿死亡、死产、新生儿窒息和死亡的主要原因^[3],为常见而又严重影响母婴安全^[4]的疾病。中医认为风痰上扰、虚风内动可致痫证发生。天麻钩藤饮为治疗风痰上扰、虚风内动的代表方,方中天麻性味甘平,具有平肝熄风之功;钩藤性味甘凉,具有清热平肝熄风之效;石决明性味咸寒,具有清肝泻火熄风之

清心复律汤治疗心脏传导失常 85 例

王 振 洲

(河南省驻马店市第二中医院, 驻马店市解放路 23 号, 463000)

关键词 心脏传导失常/中医药疗法; @ 清心复律汤

心脏传导失常, 是临床心电图检查常见的心律失常, 由心脏病变累及其传导系统所致, 可诱发或并见多种心律失常。有效改善心脏传导功能, 促进心脏疾病恢复, 是防治严重心律失常, 提高生活质量的重要措施。笔者采用清心复律汤治疗该病 85 例, 疗效满意, 现报道如下。

1 一般资料

本组病例均系门诊及住院患者, 男 51 例, 女 34 例。年龄最小 18 岁, 最大 63 岁, 平均年龄 41 岁。病程短者 10 天, 长者 8 年, 平均 2.5 年。心电图检查: 心脏传导失常并节律不齐, 伴心肌缺血型 ST-T 改变为基本特征。Ⅰ度房室传导阻滞 8 例, Ⅱ度Ⅰ型房室阻滞 21 例、Ⅱ度Ⅱ型 12 例, 不完全性左束支阻滞 11 例, 左前分支阻滞 14 例、左后分支 6 例, 完全、不完全性右束支阻滞 13 例, 可一种或多种形式出现。并节律失常者 72 例, 其中房性早搏 15 例, 心房纤颤 4 例, 房室交界性早搏 7 例, 阵发性室上性心动过速 6 例, 室性早搏 30 例, 短阵阵发性室速 8 例, 室性自主心律 2 例。心脏彩色多普勒超声检查: 左心室心肌肥厚者 35 例, 右心室扩大 8 例, 全心扩大 3 例。原发病: 病毒性心肌炎 8 例, 高血压性心脏病 14 例, 冠心病 30 例, 风湿性心脏病 14 例、肺心病 9 例, 甲状腺机能亢进 7 例, 原因不明 3 例。临床表现: 本组病例均有不同程度的心悸, 胸闷, 头晕, 脉促、结、代的症状与体征。辨证分型: 心火亢盛型 16 例, 阴虚阳亢型 25 例, 气阴亏虚型 31 例, 痰瘀痹阻型 13 例。

2 治疗方法

清心复律汤药物组成: 生地黄、麦冬、苦参、虎杖、丹参各 10~24g, 太子参 10~30g, 炙甘草 10~30g, 当

归、瓜蒌各 10~15g。加减: 兼痰浊者加贝母、桔梗、姜竹茹; 喘息加紫苏子、葶苈子、杏仁; 湿盛加泽泻、车前子、薏苡仁; 气滞加降香、郁金、延胡索; 血瘀加川芎、桃仁、红花; 气虚加西洋参、黄芪; 阳虚加附子、桂枝、细辛、淫羊藿; 肝阳上亢加钩藤、菊花、刺蒺藜、牛膝、决明子; 失眠多梦加炒酸枣仁、柏子仁、炙远志; 便秘加火麻仁、玄参、大黄; 心悸甚者加磁石、生龙骨、生牡蛎。水煎 2 次, 总煎取 1000mL, 分早晚 2 次空腹温服, 每日 1 剂, 30 天为 1 个疗程。西药治疗原发病。治疗期间心绞痛发作、心律失常伴血流动力学改变者, 应用快速扩冠类及抗心律失常药物。

3 疗效标准及结果

根据《中医病证诊断疗效标准》^[1]拟定。显效: 临床症状消失, 心电图检查传导失常消失, 节律整齐, 缺血型 ST-T 恢复正常范围, 半年内无复发者; 好转: 临床症状消失, 心电图检查传导有改善, 节律失常消失或减少, 缺血型 ST-T 恢复正常或较前有好转者; 无效: 临床症状、心电图无明显变化或失访者。结果: 85 例中, 显效 45 例, 好转 24 例, 无效 16 例, 总有效率 81.2%。

4 典型病例

患者某, 男, 42 岁, 干部。2006 年 3 月 8 日初诊。主诉: 心慌胸痛反复发作半年, 加重半月。曾在外院诊治, 诊断为“冠心病心绞痛”, 给予扩冠、抗凝、降血脂等治疗, 效果不佳转来我院。刻下: 心慌, 胸前区灼热隐痛, 活动或稍劳即憋闷疼痛, 如物压迫, 日发作 4~5 次, 喘促痰黏, 不易咳出, 口干不渴, 自汗盗汗, 小便短赤, 大便秘结, 舌质暗红, 苔薄黄乏津, 脉结、代。心电图检查: 心率 56 次/min, 偶发室性早搏, Ⅱ度Ⅱ型房室传导阻滞, T₃₋₄倒置。西医诊断: “冠心病心绞痛” “Ⅱ度Ⅱ型房室传导阻滞” “偶发室性早搏”。中医诊断: “胸痹心痛” “心悸”。气阴亏虚, 痰瘀痹阻型。治

效。黄芩、栀子, 清热泻火, 桑寄生、杜仲补肝益肾, 治其病本。益母草与川牛膝通利血脉并能导气血下行, 夜交藤、茯神安神定志。全方具有平肝熄风、清热活血、补益肝肾功效。

参考文献

[1] 国家中医药管理局全脑病急症协作组. 痫证诊断与疗效评定标准.

北京中医学院学报, 1993, 16(4): 13.

[2] 乐杰. 妇产科学. 第 5 版. 北京: 人民卫生出版社, 2001, 139.

[3] 孙丽洲. 实用临床诊疗规范——妇产科: 妊娠高血压综合征. 中国实用乡村医生杂志, 2007, 14(10): 15-16.

[4] 王长征, 邓明凤, 陈永玲. 妊娠征患者凝血指标测定. 微循环学杂志, 2005, 15(3): 80.

(2008-07-28 收稿)