

碎变形的孢子、菌丝,真菌培养阴性。有效:皮损、瘙痒、浸渍糜烂部分消退,皮屑镜检有少量孢子、菌丝,真菌培养阳性。无效:和治疗前相比较,各方面均无进步。由表2、3、4、5知,2组疗效, $P < 0.01$,有极显著差异。

6 病案举例

6.1 水疱型 患者某,男,35岁,医务人员。2008年6月就诊。患者自述患脚气7~8年,初时在左侧三、四趾间的三趾,发生针尖大小半透明疱疹5~6个,痒甚。继而成一大疱,破后出些许水液,继而患处脱皮,露红肉,痒痛难忍,不用手搔时,奇痒钻心,搔之则疼痛发作。后致除两姆趾外,余八趾间均有病灶,屡用中西药物未见效果。诊时两足患处露红肉如刺,干燥,露红肉边缘有白皮,稍一触动则叫痛。遂以脚癣液涂之,3min后,自述不知不觉痒止。嘱其1日2次涂抹药液。5日后,皮损、瘙痒完全消失,皮屑镜检和真菌培养阴性。

6.2 糜烂型 患者某,女,32岁,职工。1999年10月就诊。患者自述患脚气2个多月,初时在右侧二、三趾间的三趾,发生针尖大小半透明疱疹数个,痒甚。继而

破后出些许水液,继而患处脱皮,奇痒。1个月前,右足五指间及足背前端均破溃,红肉裸露,呈糜烂状,流淡黄色液体无干时,与袜子黏在一起,稍触则痛作。就诊几家医院,症状毫无改善,十分痛苦。遂以花椒水浸泡30min,洗净黏水,局部发白。涂以脚癣液,后候干,自述痒止。又涂第2遍,同时以脚癣散撒于疮面,令其跣患足,其夫接回家。嘱其1日2次来进行如上治疗。1周后,皮损、瘙痒及黄水完全消失,疮面光洁如初。皮屑镜检和真菌培养阴性。

7 讨论

脚癣液为酸性,对真菌有较强的杀灭力;脚癣散有很好的收敛、吸收作用。配合使用可快速治疗浸渍糜烂型足癣,防止足癣继发感染及并发症。对角化型患者可能是因为病灶处皮肤粗厚,药液不易渗透而影响了临床效果。如果在涂药前配合局部病灶的修正,削薄厚皮后再涂药液,或许会增加疗效。对于糜烂型患者,治疗时先用花椒水浸洗患处,再涂药液和药粉,可以使疗效增强。

(2009-08-16 收稿)

定经汤临床应用举例

马 东

(内蒙古鄂尔多斯市中心医院,017000)

关键词 @ 定经汤

定经汤出自明末清初著名医家傅山所著《傅青主女科》一书,为治疗“经水先后无定期”之方。后世医家对于定经汤很少有专门探讨,故用之者不如傅山其他方剂多。但临床实践证明,定经汤确为“不治之治,正妙于治”的具有实际价值的效方。观傅山创制的定经汤之遣方用药,实为逍遥散去白术、薄荷、生姜、甘草,加菟丝子、熟地黄、山药、荆芥穗而成。综观其方药组成,不失为一张好方。虽然原为“经水先后无定期”而设,但异病可以同治,只要辨为肝肾郁滞之证,用之得当,效果显著。

例1:患者某,女,30岁。患者平素体健,月经正常。近半年来因夫妻不和而郁怒悲伤,月经或提前行,或至期不行,甚为其苦,曾服疏肝理气之剂30余剂,病情没有明显改善。患者神情沉默抑郁,腰胁偶见隐隐不舒,经行前小腹胀痛,月经色黑,夹有血块,胸中懊恼不舒,喜叹息,心烦失眠,大便干结难行,二、三日1次,舌紫暗苔薄白,脉弦。此肝肾之气郁滞,气病及血,气

滞血瘀之证。治法宜舒肝肾之气,兼活血调经。以傅氏定经汤加减:菟丝子30g,白芍30g,当归30g,熟地黄15g,山药15g,茯苓12g,炒荆芥10g,柴胡10g,枳实12g,香附12g,桃仁10g,红花10g,益母草15g,决明子30g,生甘草5g,水煎服,每日1剂。服药6剂后,腰胁已舒,心情较为畅快,大便已通,每日1次。为巩固疗效,前方续服12剂,以后月经按月如期而行。

例2:患者某,男,33岁。患者1年前发现自己阳事举而不坚,自以为过度劳累所致,自购补肾壮阳之药服用月余,未见明显效果。患者神情抑郁,腰骶酸痛,胸胁时有不适感,夜不能寐,舌淡苔白,脉弦细。此肝气郁滞,肝病及肾,肾气虚而壅塞之证。治法宜舒肝肾之气,兼补肾虚。借用傅氏定经汤加减:菟丝子30g,白芍30g,当归30g,熟地黄15g,山药15g,茯苓12g,柴胡10g,枳壳10g,白蒺藜15g,蛇床子15g,蜈蚣1条(研末吞服),生甘草5g,水煎服,每日1剂。服药6剂后,临房阳事举而稍坚。效不更方,前后共用本方调治近1个月,康复如初。

(2009-07-12 收稿)