

重程度评分综合了运动、感觉、反射、整体情况以及感觉运动整合等能力,从一定程度上弥补了单一测试的缺点。

中风多发于中老年人,大部分存活患者留有不同程度的后遗症。究其病因病机多为气虚血瘀,其病性多为本虚标实、虚实夹杂。王清任创制补阳还五汤,以黄芪四两补气为君,伍以活血化瘀药为辅,以补气活血立法治疗本病,是临床上治疗中风后遗症的经典方剂,疗效确切,在本实验中能明显提高 NSS 评分,改善神经缺失症状,从中药药理学角度论证了其疗效。

参考文献

- [1] 吴兆苏,姚崇华,赵冬.我国人群脑卒中发病率、死亡率的流行病学研究.中华流行病学杂志,2003,24(3):236-239.
- [2] 黄茂盛,洪震,曾军,等.90年代上海社区脑卒中发病率、死亡率及其危险因素动态分析.中华流行病学杂志,2001,22(3):198-201.
- [3] 胡善联,龚向光.中国缺血性脑卒中的疾病经济负担.中国卫生经济,2003,22(12):18-20.
- [4] 周正芳.补阳还五汤加味治疗中风后遗症50例.实用中医内科杂志,2005,19(2):153.

- [5] 罗卫东,李力.补阳还五汤治疗中风后遗症150例疗效观察.中医药学报,2005,33(5):49.
- [6] 周勇军.补阳还五汤加味治疗中风康复45例观察.时珍国医国药,2006,17(2):250.
- [7] 刘永平,曾玲,曾祥碧.补阳还五汤加针刺治疗脑梗死恢复期临床观察.四川中医,2003,21(11):37-39.
- [8] 樊春燕,杨军.补阳还五汤加味治疗脑血管病恢复期及后遗症期114例.陕西中医,2005,26(7):669-670.
- [9] Zea Longa EL, Weinstein PR, Carlson S, Cummins R. Reversible middle cerebral artery occlusion without craniectomy in rats. Stroke, 1989, 20: 84-91.
- [10] A. J. Hunter, J. Hatcher, D. Virley, et al. Functional assessments in mice and rats after focal stroke. Neuropharmacology, 39(2000): 806-816.
- [11] M. Josh Hasbani, Suzanne M. Underhill, et al. Synapse Loss and Regeneration: A Mechanism for Functional Decline and Recovery after Cerebral Ischemia. THE Neuroscientist, 2002, 6(2): 110-119.
- [12] Barbay S, Plautz EP, Friel KM, et al. Delayed rehabilitative training following a small ischemic infarct in nonhuman primate primary motor cortex (M1). Soc Neurosci Abstr, 2001, 27: 931-934.

(2011-03-17 收稿)◎

自拟生肌粉用于肛瘘术后换药70例

缙美玉 王志华

(新疆乌鲁木齐市中医医院肛肠科, 830000)

关键词 肛瘘术后/中医药疗法; @ 生肌粉

我科将生肌粉用于肛瘘术后换药,并与常规换药做比较观察,发现生肌粉能够促进伤口愈合,缩短疗程,现报道如下。

1 临床资料

选择2010-2011年在我科住院的肛瘘手术患者140例,其中男116例,女24例;年龄1~70岁。随机分为治疗组和对照组,2组患者的病情、年龄、病程均具有可比性。2组患者在同等条件下做如下观察:1)术后2、5、10天创面分泌物量的变化;2)创面的大小及深浅情况;3)创面愈合天数。

2 用药方法

治疗组术后创面用碘伏棉球消毒,露出新鲜创面,用喉头喷雾器将生肌粉均匀喷撒在创面,油纱条压迫引流,外用无菌敷料覆盖,胶布固定,每日1次,至疮口愈合。对照组以油纱条压迫引流,每日1次,余同治疗组。将2组疗效进行 χ^2 检验。

3 结果

治疗组70例,分别在2、5天观察伤口分泌物量,明显少于对照组,10天时分泌物基本消失,创面逐渐缩小,变浅,且创面新鲜,肉芽组织生长良好,无水肿及过

度生长现象,无假性愈合。平均愈合天数20天。对照组70例,分别在2、5天观察创面分泌物量明显多于治疗组,10天时有大量分泌物46例,有少数分泌物10例,无分泌物14例。肉芽组织生长良好14例。平均愈合天数33天。经统计学分析,其差异显著($P < 0.05$)。

4 治疗体会

肛瘘术后创口形成放射性创面,创口必须从创面基底部开始生长,术后换药为治疗的关键环节,换药的重点是清热解毒,祛毒生新。自拟生肌粉的主要成分为天然牛黄、麝香、冰片、升丹、熊胆、血竭、珍珠母等,具有清热解毒,消痈止痛,祛腐收敛生肌的作用。中医学将促进伤口愈合的作用分为清热解毒,祛腐提脓,生肌收口几个步骤,现代医学认为手术创面的愈合分创面渗出期,肉芽组织增生期,瘢痕形成期,自拟生肌粉正是针对以上3个创面恢复阶段,用中草药配制,取其具有清热解毒排脓,祛腐生肌收口的功效,选用合适药物作用与创伤修复的不同阶段,发挥其最佳作用。通过临床观察,自拟生肌粉用于肛瘘术后换药,可加速术后创面的愈合。

(2011-05-11 收稿)◎