

名老中医郑伟达应用慈丹胶囊治疗肺气不足型肺癌临证医案 3 则

郑东京¹ 郑东海² 郑伟鸿³ 许 鑫³ 郑伟达³

(1 北京中医药大学, 北京, 100029; 2 福州伟达中医肿瘤医院, 福州, 350008; 3 北京伟达中医肿瘤医院, 北京, 100023)

摘要 原发性支气管肺癌简称为肺癌,是指原发于支气管黏膜的肺泡癌。郑伟达教授经过长期临床实践总结出肺癌多由正气内虚,邪毒内结所致,郑教授将其分为:阴虚毒热型、气阴两虚型、脾虚痰湿型、肺肾两虚型。本文提取临证医案 3 则,就郑教授运用慈丹胶囊治疗气阴两虚型肺癌取得显著疗效进行总结探析。

关键词 慈丹胶囊; @ 郑伟达; 原发性肺癌; 气阴两虚; 肺癌; 医案

中图分类号: R249. 2/. 7; R273 **文献标识码**: B **doi**: 10. 3969/j. issn. 1673 - 7202. 2016. 01. 028

原发性支气管肺癌简称为肺癌,是指原发于支气管黏膜的肺泡癌,不包括转移性肺癌及气管癌。郑教授认为肿瘤是全身性疾病的局部表现,应在中医理论指导下,辨证论治,遂立方用药。郑教授根据多年临床经验,将肺癌分为 4 个类型:阴虚毒热型、气阴两虚型、脾虚痰湿型、肺肾两虚型。其中本文主要介绍的气阴两虚型并非有虚无实,而是瘀毒侵肺,迁延日久,耗气伤阴,是因实致虚。故在临床治疗中,应攻补结合。慈丹胶囊中莪术破血消瘀,山慈菇消肿解毒为君药。马钱子、蜂房、鸦胆子等消肿散结,通络止痛为臣,佐以补气补血的黄芪、当归,对肿瘤有显著的抑制作用,为国家准字药,投入临床数十年。治疗中既要以慈丹胶囊化瘀解毒以控制肿块,又要配合方药益气养阴以逐渐恢复人体功能。以下为郑教授临证医案 3 则:

1 案例一

某,男,40 岁,福州人。1992 年 5 月 6 日初诊。患者 1992 年初因咳嗽,久治不效。1 月份住进协和医院,诊为肺癌,并行手术,手术后又经化疗 2 个疗程,体质很差,伴颈部淋巴转移。今见:患者精神欠佳,外观憔悴,咳嗽吐痰,痰带血丝,微有头痛头晕。舌红少苔,脉细沉。证属:气阴双亏,痰气瘀滞;治宜:益阴清肺,兼以清化。方药:中成药:慈丹胶囊、复方莪术消瘤胶囊、仙鹤益寿胶囊,5 粒/次,4 次/d。汤药:西洋参 6 g(兑服)、生地黄 25 g、麦冬 10 g、沙参 30 g、当归 6 g、五味子 6 g、白茅根 20 g、山茱萸 10 g、仙鹤草 30 g、三七粉 3 g(分吞)、山慈菇 10 g,日 1 剂,水煎服。各药治疗 2 个疗程,3 个月为 1 个疗程,身体完全恢复健康。经过 3 次 X 线片均无发现异常,情况良好,疗效特别显著,恢复全日上班已 5 年

余。

按:临床所见近千例肺癌患者,大多虚实夹杂,早期邪实为主,多见痰热壅盛,毒邪化热及气血瘀滞,后期毒邪未除而正气渐虚,多挟见气阴两亏、脾虚痰阻或肺肾两亏,临床侧重保护正气,尤以运脾为重。但求后天之本不败,能进饮食,则祛邪攻坚、消痰化滞自有可举之处,故常于攻痰清毒化坚配伍健脾、益气养阴,每多奏效。

2 案例二

某,男 56 岁。1996 年 3 月因胸痛 CT 扫描检查显示:右肺下部肿块约 6 cm × 5.6 cm,诊断为原发性肺癌伴纵隔转移。患者有高血压史,因病属晚期,无法手术及化疗,故于 4 月 6 日来院求诊。现咳痰带血,干咳少痰,呼多吸少,登楼喘促,纳食不香,心慌气短,易汗,舌苔薄,脉细。证属:气阴亏损,邪毒内侵;治宜:滋阴补气,引毒外出。方药:中成药:慈丹胶囊、复方莪术消瘤胶囊、参灵胶囊,各 5 粒/次,4 次/d。汤药:西洋参 6 g、麦冬 10 g、五味子 6 g、仙鹤草 30 g、黄芪 30 g、柴胡 10 g、甘草 6 g、当归 10 g、川贝母 10 g,水煎口服,日 1 剂,连服 30 剂。

上药尽剂,诸症皆减,此后续服成药与汤药,并嘱常服西洋参。至 1997 年 7 月 17 日,患者服药 5 个疗程,复查诊断告之:病灶缩小至直径约 1 cm,并数次出差旅游,体重增加,形体渐佳。目前仍在继续就诊中,药味变化总不离生脉饮,应健脾补肺,视病情进退而定。

3 案例三

某,女,61 岁。1996 年 12 月 13 日在上海几个大医院 CT 检查确诊为:右上肺中心型大细胞癌,合

(下接第 112 页)

10 g、桔梗 6 g、浙贝母 10 g。2012 年底随访,患者肿瘤已消失,精神较好,无诉不适。

3 案例三

某,男,60 岁,大连大学物理系教授。病历号:199104。初诊日期:2002 年 1 月 19 日。患者于 2001 年 1 月 9 日在上海胸科医院 CT 诊断为中心型肺癌,即行肺叶切除手术,术后病理报告为低分化腺癌,即行化疗 6 个周期,终因化疗后引起恶心、呕吐、精神不振、食欲下降、全身乏力,白细胞计数降至 $2 \times 10^9/L$ 等较严重的化疗药物不良反应,并出现肺不张、支气管炎等症,而终止化疗。现症:咳嗽,痰血,胸痛,胸闷气短,神疲,消瘦,纳差,大便溏薄,小便清利,舌苔白腻,脉濡。证属:脾胃亏虚,痰湿凝聚;治宜:健脾补胃,软坚化痰。方药:慈丹胶囊,5 粒/次,4 次/d,并配合补气养阴、软坚化痰为法中药汤剂治疗。

二诊(2002 年 3 月 26 日):药后咳嗽消除,痰血消失,胸痛胸闷亦减,精神好转。余症同前,效不更方,再续前方药连服 1 个月。三诊(2002 年 6 月 2 日):药后诸症虽失,但舌光红,苔光剥,脉细弱。此为病久伤元,气耗伤精,以致阴亏。治则:滋阴补气为主。方药:慈丹胶囊为主,配以养阴益肺为法中药汤剂治疗。四诊(2002 年 7 月 12 日):症状同前,舌苔脉象已转正常,人若常人,每日食量 0.5 kg,体重增加 3 kg。医院 CT 复查示:原发病灶消失,未发现新病灶。上述症状消失,身体逐步恢复,体力逐渐增加,精神良好。自己特步行至院感谢,嘱其“不可操劳太过,常饮西洋参、薏米粥”。其后又继续巩固治疗 6 个月,已重新回到工作岗位,担任指导研究生工作。

(2015-08-25 收稿 责任编辑:王明)

(上接第 110 页)

并肺不张及支气管隆突部淋巴结转移。因体质差,未进行放疗、化疗。今见:心悸气短,咳嗽少痰,痰中带血,色鲜,登楼时喘促,纳食不香而少于平时,脉沉微数,舌苔薄少,一派心肺气阴两虚之象。方药:中成药:慈丹胶囊、复方莪术胶囊、仙鹤益寿胶囊,各 5 粒/次,4 次/d。汤药:党参 15 g、太子参 30 g、麦冬 20 g、五味子 6 g、枳实 10 g、山茱萸 10 g、茯苓 20 g、仙鹤草 30 g、当归 10 g、川芎 6 g、白花蛇舌草 30 g、陈皮 6 g,日 1 剂,连服 2 个疗程。

二诊(1997 年 5 月 26 日):经服上药 2 个疗程

后,病情稳定,肿瘤缩小,右肋紧缩感已无,以上诸症悉除。睡眠差,口苦,时感恶心,舌苔黄腻,脉细弱。此为阴虚痰滞,以清化为法。方药:中成药:慈丹胶囊、复方莪术消瘤胶囊、扶正固本胶囊、仙鹤益寿胶囊,各 5 粒/次,4 次/d;甘芫逐水丸,1 g/次,3 次/d。汤药:太子参 30 g、白花蛇舌草 30 g、山楂 30 g、柴胡 10 g、枳壳 10 g、杭白芍 10 g、炙甘草 6 g、白术 10 g、茯苓 10 g、陈皮 10 g、半夏 10 g、竹茹 10 g、丁香 3 g,日 1 剂,连服 15 剂。服上药后,复查肿瘤已缩小,未见新病灶。嘱其续服中成药。

(2015-08-25 收稿 责任编辑:王明)